UNIVERSITÄT BERN

Medizinische Fakultät
Institut für Infektionskrankheiten

Klinische Mikrobiologie

Probenentnahme Allg. Bakteriologie

Biopsie

Allgemein

Probe nach Entnahme in ein dicht schliessendes, steriles Gefäss geben. Kleine Biopsien auf einen mit wenig steriler physiologischer Kochsalzlösung befeuchteten Gazetupfer legen, um ein Austrocknen der Probe zu vermeiden.

Hinweis: **KEIN** Formalin verwenden!

Der Verdacht auf Brucellose muss auf dem Auftragsformular vermerkt werden:

1. Der kulturelle Nachweis von *Brucella* spp. verlangt spezielle Verfahren.
2. Zum Schutz der Laborpersonen vor Infektionen; Infektionen mit *Brucella* spp. gehören zu den häufigsten im Labor erworbenen Infektionskrankheiten!

Der unverzügliche Transport ins Labor erhöht die Nachweisrate. Falls dieser nicht möglich ist, Zwischenlagerung der Probe bei 2-8°C.

Der kulturelle Nachweis von *Helicobacter pylori* aus Magenschleimhautbiopsien wird nur nach telefonischer Voranmeldung beim Dienstakademiker Bakteriologie (181-6701) durchgeführt. Keine Zwischenlagerung; die Probe muss unverzüglich ins Labor gebracht werden.

Tel. +41 031 632 32 65
Fax +41 031 632 49 66
www.ifik.unibe.ch