

Probenentnahme Allg. Bakteriologie

Liquor

Steriles Gefäss

Mikroskopischer und kultureller Erregernachweis: Mindestmenge: 0.5 ml

Hinweis:

Der unverzügliche Transport ins Labor erhöht die Nachweisrate. Falls dieser nicht möglich ist, Zwischenlagerung der Probe bei 2-8°C.

Unbedingt auf ausreichende Probenmenge achten, wenn Analysen aus verschiedenen Einheiten veranlasst werden (Summe der Mindestmengen). Es gelten folgende Richtgrössen:

- Mykobakteriologie (mikroskopischer und kultureller Erregernachweis): Mindestmenge: 1.0 ml
- Mykologie (mikroskopischer und kultureller Erregernachweis): Mindestmenge: 0.5 ml
- Parasitologie (mikroskopischer und/oder molekularbiologischer Erregernachweis): Mindestmenge: 0.5 ml
- Virologie (kultureller und/oder molekularbiologischer Erregernachweis): Mindestmenge: 0.5 ml
- Antikörperrnachweis (Infektserologie): Mindestmenge: 0.1 ml pro verlangtem Antikörperrnachweis

Wichtig:

Indikationen für den Antikörperrnachweis im Liquor sind:

- Neuroborreliose
- Neurosyphilis
- Subakutsklerosierende Panenzephalitis (SSPE)
- Zystizerkose

Bei den oben aufgeführten Fragestellungen ist unbedingt gleichzeitig 5-10 ml Nativblut (z.B. Monovette weiss) einzusenden.