

## Probenentnahme Mykobakteriologie

### Liquor

Steriles Gefäss.

Mikroskopischer und kultureller Erregernachweis: Mindestmenge: 1.0 ml  
Molekularbiologischer Nachweis von *Mycobacterium tuberculosis*-Komplex: Mindestmenge: 0.5 ml

#### Hinweis:

Der molekularbiologische wird nur zusammen mit dem mikroskopischen und kulturellen Erregernachweis durchgeführt.

Der unverzügliche Transport ins Labor erhöht die Nachweisrate. Falls dieser nicht möglich ist, Zwischenlagerung der Probe bei 2-8°C.

Unbedingt auf ausreichende Probenmenge achten, wenn Analysen aus verschiedenen Einheiten veranlasst werden (Summe der Mindestmengen). Es gelten folgende Richtgrössen:

- Allgemeine Bakteriologie (kultureller Erregernachweis): Mindestmenge: 0.5 ml
- Mykologie (kultureller Erregernachweis): Mindestmenge: 0.5 ml
- Parasitologie (molekularbiologischer Erregernachweis): Mindestmenge: 0.5 ml
- Virologie (kultureller und/oder molekularbiologischer Erregernachweis): Mindestmenge: 0.5 ml
- Antikörperrnachweis (Infektserologie): Mindestmenge: 0.1 ml pro verlangtem Antikörperrnachweis

#### Wichtig:

Indikationen für den Antikörperrnachweis im Liquor sind:

Neuroborreliose

Neurosyphilis

Subakutsklerosierende Panenzephalitis (SSPE)

Zystizerkose

Bei den oben aufgeführten Fragestellungen ist unbedingt gleichzeitig 5-10 ml Nativblut (z.B. Monovette weiss) einzusenden.