

Probenentnahme Virologie

Liquor

Steriles Gefäss.

Kultureller und/oder molekularbiologischer Erregernachweis: Mindestmenge: 0.5 ml

Hinweis: Der unverzügliche Transport ins Labor erhöht die Nachweisrate. Falls dieser nicht möglich ist, Zwischenlagerung der Probe bei 2-8°C.

Unbedingt auf ausreichende Probenmenge achten, wenn Analysen aus verschiedenen Einheiten veranlasst werden (Summe der Mindestmengen). Es gelten folgende Richtgrössen:

Mykologie (mikroskopischer und kultureller Erregernachweis):	Mindestmenge: 0.5 ml
Mykobakteriologie (mikroskopischer und kultureller Erregernachweis):	Mindestmenge: 1.0 ml
Parasitologie mikroskopischer und/oder molekularbiologischer Erregernachweis):	Mindestmenge: 0.5 ml
Antikörperrnachweis (Infektserologie):	Mindestmenge: 0.2 ml pro verlangtem Antikörperrnachweis

Wichtig:

Indikationen für den Antikörperrnachweis im Liquor sind:

Neuroborreliose

Neurosyphilis

Subakutsklerosierende Panenzephalitis (SSPE)

Zystizerkose

Bei den oben aufgeführten Fragestellungen ist unbedingt gleichzeitig 5-10 ml Nativblut (z.B. Monovette weiss) einzusenden.