

Probenentnahme Mykologie

Respiratorische Proben

Bronchialspülflüssigkeit

Steriles Gefäss.

Hinweis: Der Nachweis von *Pneumocystis carinii*, *Cryptococcus* spp. und dimorphen Pilzen (*Blastomyces* spp., *Coccidioides* spp., *Histoplasma* spp.; Endemiegebiete beachten!) muss auf dem Auftragsformular gezielt verlangt werden.

Bronchoalveoläre Lavage

50-100 ml Probe in einem dicht schliessenden, sterilen Gefäss mit speziellem Auftragsformular.

Die Verwendung dieses Auftragsformulares erleichtert die syndromorientierte Abklärung.

Der Nachweis von *Pneumocystis carinii*, *Cryptococcus* spp. und dimorphen Pilzen (*Blastomyces* spp., *Coccidioides* spp., *Histoplasma* spp.; Endemiegebiete beachten!) kann auf diesem Auftragsformular auch gezielt verlangt werden.

Hinweis: Telefonische Voranmeldung auf die Suchernummer 181-6701 ist erforderlich.

Die Probe muss bis 14:00 Uhr das Institut erreicht haben, damit die Probenverarbeitung am gleichen Tag gewährleistet werden kann.

Der unverzügliche Transport ins Labor erhöht die Nachweisrate. Falls dieser nicht möglich ist, Zwischenlagerung der Probe bei 2-8°C.

Sputum

Steriles Gefäss.

Der Nachweis von *Cryptococcus* spp. und dimorphen Pilzen (*Blastomyces* spp., *Coccidioides* spp., *Histoplasma* spp.; Endemiegebiete beachten!) muss auf dem Auftragsformular gezielt verlangt werden.

Hinweis: Nicht geeignet für den Nachweis von *Pneumocystis carinii*.

Der unverzügliche Transport ins Labor erhöht die Nachweisrate. Falls dieser nicht möglich ist, Zwischenlagerung der Probe bei 2-8°C.

Sputum, induziert

Steriles Gefäss.

Geeignet für den Nachweis von *Pneumocystis carinii*.

Hinweis: Der Nachweis von *Pneumocystis carinii*, *Cryptococcus* spp. und dimorphen Pilzen (*Blastomyces* spp., *Coccidioides* spp., *Histoplasma* spp.; Endemiegebiete beachten!) muss auf dem Auftragsformular gezielt verlangt werden.

Der unverzügliche Transport ins Labor erhöht die Nachweisrate. Falls dieser nicht möglich ist, Zwischenlagerung der Probe bei 2-8°C.

Tracheobronchialsekret

Steriles Gefäss.

Der Nachweis von *Cryptococcus* spp. und dimorphen Pilzen (*Blastomyces* spp., *Coccidioides* spp., *Histoplasma* spp.; Endemiegebiete beachten!) muss auf dem Auftragsformular gezielt verlangt werden.

Hinweis: Nicht geeignet für den Nachweis von *Pneumocystis carinii*.

Der unverzügliche Transport ins Labor erhöht die Nachweisrate. Falls dieser nicht möglich ist, Zwischenlagerung der Probe bei 2-8°C.