Analysenangebot

GdA = im Geltungsbereich der Akkreditierung der Klinischen Mikrobiologie
S = Selbst durchgeführt,
U = Unterauftragnehmer (siehe Liste letzte Seite)

Untersuchung	Messmethode	Untersuchungsmaterial	Analysefrequenz	Resultatverfügbarkeit	GdA	S / U	TP	Labor
16S rDNA-PCR (eubakterielle PCR; bakterielle Breitspektrum-PCR)	PCR mit anschliessender Sequenzierung	Ausscheidungsprodukte, Gewebe, Körperflüssigkeiten, Organe, Zerfallsprodukte	2x wöchentlich	3-4 Tage nach Testansatz	nein	S	119.7	KM-Bakteriologie
Acanthamoeba spp. PCR qualitativ	PCR qualitativ	Hornhautabradat, Hornhautbiopsie, Kontaktlinse, Kontaktlinsen-Aufbewahrungslösung	2x wöchentlich	24 Stunden nach Testansatz	nein	S	119.7	KM-Parasitologie
Acanthamoeben (Direkt-Mikroskopie)	Mikroskopischer Nachweis	Hornhautabradat, Hornhautbiopsie, Kontaktlinse, Kontaktlinsen-Aufbewahrungslösung	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	Ja	S	26.1	KM-Parasitologie
Acanthamoeben (Kultur)	Kultureller Nachweis	Hornhautabradat, Hornhautbiopsie, Kontaktlinse, Kontaktlinsen-Aufbewahrungslösung	täglich ausser Samstag und Sonntag	5 Tage nach Testansatz	Ja	S	41.4	KM-Parasitologie
Adenoviren PCR quantitativ	PCR quantitativ	EDTA- Blut, Liquor, Plasma, Stuhl, Urin	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Adenoviren Genotypisierung	Sequenzierung	Zellkulturmaterial	Bei Bedarf	3-4 Tage nach Testansatz	Ja	S	135	KM-Molekulare-Analytik
Adenoviren Schnelltest	Immunchromatographie	Stuhl nativ	täglich ausser Sonntag	gleichentags	Ja	S	26.1	KM-Zellbasierte-Virologie
Adenovirus PCR qualitativ	PCR qualitativ	Abstriche, Biopsien, Blut, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), EDTA- Blut, Flüssigkeiten, Liquor, Plasma, Punktate, Respiratorische Proben, Serum, Stuhl, Urin	täglich ausser Samstag und Sonntag	48 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Adenovirus Zellkultur	Kultureller Nachweis	Abstriche, Biopsien, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Flüssigkeiten, Punktate, Respiratorische Proben, Stuhl nativ, Urin	täglich ausser Sonntag	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	26.1, 66.6	KM-Zellbasierte-Virologie
Adenovirus IgA	EIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	29.7	KM-Infektionsdiagnostik
Adenovirus IgG	EIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	25.2	KM-Infektionsdiagnostik
Alinity SARS-CoV-2 Anti-Nucleocapsid IgG	CMIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 2 mal pro Woche	gleichentags	nein	S	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Amöben Antikörper	EIA	Serum, z-Keine weitere Probenarten	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	26.1	KM-Parasitologie
Anisakis IgG Antikörper	EIA	Serum, z-Keine weitere Probenarten	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	42.3	KM-Parasitologie
Ascaris lumbricoides Antikörper	EIA	Serum, z-Keine weitere Probenarten	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	42.3	KM-Parasitologie
Aspergillus fumigatus Nukleinsäureamplifikation	PCR	Biopsien, Blut, Liquor, Punktate, Respiratorische Proben	Externe Analyse		nein	U 4	119.7	KM-Mykologie
Aspergillus Antigen (Galactomannan)	EIA	Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Serum	Dienstag und Donnerstag	gleichentags	Ja	S	26.1	KM-Infektionsdiagnostik
Babesia (Direkt-Mikroskopie)	Mikroskopischer Nachweis	Antikoaguliertes Blut	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	Ja	S	81.9	KM-Parasitologie
Babesia PCR qualitiativ	PCR	Blut, EDTA- Blut	Externe Analyse	Bei Bedarf, jedoch mindestens 1 mal pro Woche	nein	U 15	119.7	KM-Parasitologie
Bakeriologie gezielter Keimnachweis ohne allg. Bakt. (Einzeluntersuchung)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Abstriche, Biopsien, Punktate, Respiratorische Proben, Stuhlproben	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	37.8, 45	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Actinomyces (Einzeluntersuchung)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Abstriche, Biopsien, Punktate, Respiratorische Proben	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	37.8, 45	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Aeromonaden	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Abstriche, Biopsien, Stuhl	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	19.8, 63	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Anaerobier (Einzeluntersuchung)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Abstriche, Biopsien, Punktate, Respiratorische Proben, Urin	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	37.8, 45	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Augen und Ohr (ohne Anaerobier)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Abstriche, Biopsien, Punktate	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	56.7, 77.4	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur beta-haemolysierende Streptokokken	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Abstriche, Biopsien, Punktate, Respiratorische Proben	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	34.2, 69.3	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Biopsien (mit Anaerobiern)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Biopsien	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	139.5, 70.2	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Blutkulturen: 1 oder 2 BacT/ALERT Blutkulturflaschen mit Pilzen	Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Blutkulturen	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	139.5, 45	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Bordetella pertussis	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Abstriche nasopharyngeal, Nasopharyngeale Sekrete	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	49.5, 77.4	KM-Bakteriologie

Analysenangebot

GdA = im Geltungsbereich der Akkreditierung der Klinischen Mikrobiologie
S = Selbst durchgeführt,
U = Unterauftragnehmer (siehe Liste letzte Seite)

Untersuchung	Messmethode	Untersuchungsmaterial	Analysefrequenz	Resultatverfügbarkeit	GdA	S / U	TP	Labor
Bakterienkultur bronchoalveoläre Lavage (BAL)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Bronchoalveoläre Lavage (BAL)	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	126, 62.1	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Brucellen (Einzeluntersuchung)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Abstriche, Biopsien, Blutkulturen, Punktate, Respiratorische Proben	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	37.8, 45	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Cervix-Abstriche bei Schwangeren	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Abstriche	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	56.7, 63.0	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Corynebacterium diphtheriae	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Abstriche, Biopsien, Respiratorische Proben	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	49.5, 77.4	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Corynebacterium diphtheriae Diphtherie-Toxin-Nachweis (Elek-Test)	Nachweis bakterieller Toxine: Immunnpräzipitation	Abstriche, Biopsien, Respiratorische Proben	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	103.5	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Dialysate (mit Anaerobiern)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Dialysate	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	139.5, 62.1	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Ejakulat	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Ejakulat	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	148.5, 56.7	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Gardnerellen (Einzeluntersuchung)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Abstriche, Biopsien, Punktate (genital)	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	37.8, 45	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Gramfärbung (Einzeluntersuchung)	Mikroskopie	Abstriche, Biopsien, Punktate, Respiratorische Proben, Urin	täglich	gleichentags	Ja	S	19.8	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Haemophilus spp. (Einzeluntersuchung)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Abstriche, Biopsien, Respiratorische Proben	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	37.8, 45	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Helicobacter pylori	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Biopsien (Duodenum), Biopsien (Magen)	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	64.8, 72	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Helicobacter pylori inkl. Resistenzprüfung	Resistenzprüfung	Biopsien (Duodenum), Biopsien (Magen)	Bei Bedarf	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	23.4	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Isolator-Blutkulturen	Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Blutkulturen, Isolator	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	139.5, 64.8	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Katheter (andere; nicht intravaskuläre)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Katheter (andere)	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	30.6, 77.4	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Katheter (intravaskulär; semiquantitativ)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	intravaskuläre Katheter	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	30.6, 77.4	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Legionellen (Einzeluntersuchung)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Abstriche, Biopsien, Punktate, Respiratorische Proben	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	56.7, 72	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Liquor (mit Anaerobiern)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Liquor	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	37.8, 90	KM-Bakteriologie

Analysenangebot

GdA = im Geltungsbereich der Akkreditierung der Klinischen Mikrobiologie
S = Selbst durchgeführt,
U = Unterauftragnehmer (siehe Liste letzte Seite)

Untersuchung	Messmethode	Untersuchungsmaterial	Analysefrequenz	Resultatverfügbarkeit	GdA	S / U	TP	Labor
Bakterienkultur Listerien (Einzeluntersuchung)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Abstriche, Biopsien, Blutkulturen, Punktate, Stuhlproben	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	37.8, 45	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur MRSA (gezielte Einzeluntersuchung)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Abstriche (für MRSA-Screening), Respiratorische Proben, Urin (für MRSA-Screening)	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	119.7, 37.8, 45	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Myco-/Ureaplasmen	Mikroskopie, Qualitativer Kultureller Nachweis von aeroben Erregern	Abstriche, Biopsien, Punktate, Respiratorische Proben	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	37.8	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Neisseria gonorrhoeae (Einzeluntersuchung)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Abstriche, Biopsien, Punktate	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	37.8, 45	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Nocardien (Einzeluntersuchung)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Abstriche, Biopsien, Punktate, Respiratorische Proben	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	37.8, 45	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur obere Atemwege (Rachen-und Nasenabstriche)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Abstriche respiratorisch	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	34.2, 69.3	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur oberflächliche Abstriche (ohne Anaerobier)	Mikroskopie, Qualitativer Kultureller Nachweis von aeroben Erregern	Abstriche	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	49.5, 99	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Protheseninfektion	Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Prothesen	Externe Analyse	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	nein	U 25	139.5, 70.2	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Punktate (mit Anaerobiern)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Punktate	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	139.5, 54	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Resistenzprüfung MHK, kommerziell	Etest	Subkulturen	täglich	2 Tage nach Testansatz	Ja	S	23.4	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur respiratorische Proben (CF-Patienten)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Abstriche, Respiratorische Proben	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	49.5, 77.4	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Salmonellen (Personal Einzeluntersuchung)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Stuhlproben	täglich ausser Sonntag	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	37.8, 45	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Stuhl allg. (Salmonellen, Shigellen, Campylobacter)	Qualitativer Kultureller Nachweis von aeroben Erregern	Stuhlproben	täglich ausser Sonntag	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	139.5, 70.2	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Stuhl Nachkontrollen (Salmonellen, oder Shigellen oder Campylobacter)	Qualitativer Kultureller Nachweis von aeroben Erregern	Stuhlproben	täglich ausser Sonntag	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	19.8, 63	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur tiefe Abstriche (mit Anaerobiern)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Abstriche	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	180, 54	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur tiefe Atemwege (Sputum, Sputum induziert, TBS)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Respiratorische Proben	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	49.5, 77.4	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Tularämie (Francisella tulararensis)	Immunchromatographie	Plasma, Serum	täglich ausser Sonntag	gleichentags	Ja	S	27	KM-Infektionsdiagnostik
Bakterienkultur Urikult mit/ohne Pilze	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Urin	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	77.4, 8.4	KM-Bakteriologie

Analysenangebot

GdA = im Geltungsbereich der Akkreditierung der Klinischen Mikrobiologie
S = Selbst durchgeführt,
U = Unterauftragnehmer (siehe Liste letzte Seite)

Untersuchung	Messmethode	Untersuchungsmaterial	Analysefrequenz	Resultatverfügbarkeit	GdA	S / U	TP	Labor
Bakterienkultur Urine mit/ohne Pilznachweis	Mikroskopie, Nachweis antimikrobieller Aktivität, Nachweis biochemischer Parameter, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Urin	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	30.6, 99	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur urogenitale Abstriche allgemein	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Abstriche urogenital	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	56.7, 63.0	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Verotoxin/ verotoxinbildende E. coli und Toxinnachweis (Einzeluntersuchung)	Nachweis bakterieller Antigene: EIA	Stuhlproben	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	2 Tage nach Testansatz	Ja	S	45	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Vibrionen (Einzeluntersuchung)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Stuhlproben	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	19.8, 63	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Wachstumskontrolle	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Kulturmedien, Stammzellen	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	139.5, 54	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Wachstumskontrolle Knochenspender (mit Anaerobiern)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Biopsien (Knochen)	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	139.5, 70.2	KM-Bakteriologie
Bakterienkultur Yersinien (Einzeluntersuchung)	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Abstriche, Biopsien, Stuhlproben	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	19.8, 63	KM-Bakteriologie
Bartonella henselae IgG	IF	Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Bartonella henselae/quintana (PCR)	PCR	Biopsien, EDTA- Blut	Externe Analyse		nein	U 2	119.7	KM-Bakteriologie
Beta-D-Glucan	Turbidimetrisch	Plasma (Heparin), Serum	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	nein	S	49.5	KM-Mykologie
BK Virus (Polyomavirus) PCR quantitativ	PCR quantitativ	EDTA- Blut, Plasma, Urin	2x wöchentlich	72 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Blastomyces dermatitidis Antikörper	Immundiffusion	Serum	Externe Analyse		nein	U 12	29.7	KM-Infektionsdiagnostik
Bordetella pertussis Toxin IgA	EIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	29.7	KM-Infektionsdiagnostik
Bordetella pertussis Toxin IgG	EIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	29.7	KM-Infektionsdiagnostik
Bordetella pertussis und Bordetella parapertussis PCR qualitativ	RT-PCR qualitativ	Abstriche nasopharyngeal, Nasopharyngeale Sekrete, Respiratorische Proben	Montag, Mittwoch, Freitag	gleichentags	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Borrelia burgdorferi IgG (EIA)	EIA	Plasma, Serum	3x wöchentlich	gleichentags	Ja	S	15.7	KM-Infektionsdiagnostik
Borrelia burgdorferi IgM (EIA)	EIA	Plasma, Serum	3x wöchentlich	gleichentags	Ja	S	42.3	KM-Infektionsdiagnostik
Borrelia burgdorferi PCR qualitativ	Direktnachweis basierend auf Transcription-mediated Amplification	Biopsien, Punktate	Externe Analyse		nein	U 2	119.7	KM-Bakteriologie
Borrelia burgdorferi IgG (Rek. Immunoblot)	Rekombinanter Immunoblot	Plasma, Serum	3x wöchentlich	gleichentags	Ja	S	66.6	KM-Infektionsdiagnostik
Borrelia burgdorferi IgM (Rek. Immunoblot)	Rekombinanter Immunoblot	Plasma, Serum	3x wöchentlich	gleichentags	Ja	S	59.4	KM-Infektionsdiagnostik
Borrelia burgdorferi Liquor / Serum Index	EIA	Liquor, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	59.4, 66.6	KM-Infektionsdiagnostik
Campylobacter jejuni IgG	EIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	26.1	KM-Infektionsdiagnostik
Candida spp. PCR qualitativ	PCR	Biopsien, Blut, Liquor, Punktate	Externe Analyse		nein	U 4	119.7	KM-Mykologie
Chikungunya Virus PCR qualitativ	PCR qualitativ	Blut, Liquor, Serum	Externe Analyse		nein	U 9	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Chlamydia psittaci IgG	MIF	Serum	Externe Analyse		nein	U 12	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Chlamydia psittaci IgM	MIF	Plasma, Serum	Externe Analyse		nein	U 28	42.3	KM-Infektionsdiagnostik
Chlamydia trachomatis IgA	EIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	42.3	KM-Infektionsdiagnostik
Chlamydia trachomatis IgG	EIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Chlamydia pneumoniae PCR qualitativ	Real-Time PCR qualitativ	Abstriche nasopharyngeal, Nasopharyngeale Sekrete, Respiratorische Proben	Montag, Mittwoch, Freitag	gleichentags	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Chlamydia trachomatis Genotypisierung	Sequenzierung	Abstriche, Biopsien, Erststrahlurin, Flüssigkeiten, Punktate, Respiratorische Proben	Externe Analyse		nein	U 4	180	KM-Molekulare-Analytik
Chlamydia trachomatis PCR qualitativ	PCR qualitativ	Abstriche, Biopsien, Erststrahlurin, Flüssigkeiten, Punktate, Respiratorische Proben	3x wöchentlich	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	47.7	KM-Molekulare-Analytik
Clostridium difficile Antigen	Nachweis bakterieller Antigene: EIA	Stuhlproben	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	Ja	S	42.3	KM-Bakteriologie
Clostridium difficile Toxin	RT-PCR qualitativ	Stuhlproben	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	Ja	S	119.7	KM-Bakteriologie
Coccidioides immitis Antikörper	Immundiffusion	Plasma, Serum	Externe Analyse		nein	U 12	29.7	KM-Infektionsdiagnostik
Coronaviren PCR qualitativ	PCR qualitativ	Abstriche nasopharyngeal, Biopsien, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Flüssigkeiten, Punktate, Respiratorische Proben	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	72	KM-Molekulare-Analytik
Coxiella burnetii (Q-Fieber) Phase I IgA	IF	Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	42.3	KM-Infektionsdiagnostik
Coxiella burnetii (Q-Fieber) Phase I IgG	IF	Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Coxiella burnetii (Q-Fieber) Phase I IgM	IF	Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	42.3	KM-Infektionsdiagnostik
Coxiella burnetii (Q-Fieber) Phase II IgA	IF	Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	42.3	KM-Infektionsdiagnostik

Analysenangebot

GdA = im Geltungsbereich der Akkreditierung der Klinischen Mikrobiologie
S = Selbst durchgeführt,
U = Unterauftragnehmer (siehe Liste letzte Seite)

Untersuchung	Messmethode	Untersuchungsmaterial	Analysefrequenz	Resultatverfügbarkeit	GdA	S / U	TP	Labor
Coxiella burnetii (Q-Fieber) Phase II IgG	IF	Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Coxiella burnetii (Q-Fieber) Phase II IgM	IF	Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	42.3	KM-Infektionsdiagnostik
Cryptococcus	Mikroskopie, Qualitativer und semiquantitativer kultureller Nachweis von aeroben und anaeroben Erregern	Biopsien, Punktate	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	49.5, 77.4	KM-Bakteriologie
Cryptococcus neoformans Antigen	Immunchromatographie	Liquor, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	69.3	KM-Infektionsdiagnostik
Cyclospora cayetanensis	Mikroskopischer Nachweis	Stuhl	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	Ja	S	40.5	KM-Parasitologie
Cystoisospora belli	Mikroskopischer Nachweis	Stuhl	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	Ja	S	40.5	KM-Parasitologie
Cytomegalovirus IgG (2)	CMIA	Plasma, Serum	täglich ausser Sonntag	gleichentags	Ja	S	22.5	KM-Infektionsdiagnostik
Cytomegalovirus IgM (2)	CMIA	Plasma, Serum	täglich ausser Sonntag	gleichentags	Ja	S	22.5	KM-Infektionsdiagnostik
Cytomegalovirus PCR qualitativ	PCR qualitativ	Abstriche, Biopsien, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Flüssigkeiten, Knochenmark, Liquor, Punktate, Respiratorische Proben, Urin	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Cytomegalovirus PCR quantitativ	PCR quantitativ	Abstriche, Biopsien, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), EDTA- Blut, Flüssigkeiten, Knochenmark, Liquor, Plasma, Punktate, Respiratorische Proben, Urin	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Cytomegalovirus Resistenztestung	Sequenzierung	Abstriche, Biopsien, Blut, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), EDTA- Blut, Flüssigkeiten, Knochenmark, Liquor, Plasma, Punktate, Respiratorische Proben, Serum, Urin	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	3-4 Tage nach Testansatz	Ja	S	119.7, 119.7, 119.7	KM-Molekulare-Analytik
Cytomegalovirus Zellkultur	Kultureller Nachweis	Abstriche, Biopsien, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Flüssigkeiten, Punktate, Respiratorische Proben, Urin	täglich ausser Sonntag	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	66.6	KM-Zellbasierte-Virologie
Dengue Duo Schnelltest (NS1-Ag, IgG und IgM)	Immunchromatographie	Serum	täglich	gleichentags	Ja	S	26.1	KM-Infektionsdiagnostik
Dengue IgG und IgM quantitativ	EIA	Plasma, Serum	2x wöchentlich	gleichentags	Ja	S	29.7, 37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Dengue Virus PCR	PCR qualitativ	EDTA- Blut, Plasma	Externe Analyse		nein	U 9	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Dermatophyten	Mikroskopischer und kultureller Nachweis	Haare, Hautbiopsie, Hautschuppen, Nagel	täglich ausser Samstag und Sonntag	Mikroskopie: gleichentags Kultur: Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	78.3, 90	KM-Mykologie
Dermatophyten Nukleinsäurenachweis	Hybridisierung, PCR	Haare, Hautschuppen, Nagel	2x wöchentlich	2 Tage nach Testansatz	nein	S	119.7, 26.1	KM-Mykologie
Dimorphe Pilze	Mikroskopie, Qualitativer kultureller Nachweis von Hefe- und Schimmel-Pilzen	Abstriche, Biopsien, Blut, Punktate, Respiratorische Proben	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	126, 86.4	KM-Bakteriologie
Echinococcus Western blot	WB	Serum	Wöchentlich		Ja	S	76.5	KM-Parasitologie
Echinococcus Western blot LDBIO	WB	Serum	Wöchentlich	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S		KM-Parasitologie
Echinokokken	Mikroskopischer Nachweis	Biopsien, Punktate, Urin	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	Ja	S	40.5	KM-Parasitologie
Echinokokken Antikörper	EIA / WB	Liquor, Serum	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	37.8, 42.3, 76.5	KM-Parasitologie
Ektoparasiten	Mikroskopischer Nachweis	Flöhe, Läuse, Mücken, Parasitenidentifizierung, Wanzen	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	Ja	S	26.1	KM-Parasitologie
Endoparasiten	Mikroskopischer Nachweis	Nematoden, Trematoden, Zestoden (Proglottiden)	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	Ja	S	26.1	KM-Parasitologie
Entamoeba histolytica Antigen	EIA	Stuhl	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	29.7	KM-Parasitologie
Entamoeba histolytica/dispar	Mikroskopischer Nachweis	Biopsien, Punktate, Stuhl	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	Ja	S	40.5	KM-Parasitologie
Entamoeba histolytica PCR qualitativ	PCR	Biopsien, Punktate, Stuhl	Externe Analyse	Bei Bedarf, jedoch mindestens 1 mal pro Woche	nein	U 24	119.7	KM-Parasitologie
Enterobius vermicularis	Mikroskopischer Nachweis	Abklatsch perianal (Klebstreifen)	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	Ja	S	26.1	KM-Parasitologie
Enteroviren Genotypisierung	Sequenzierung	Zellkulturmaterial	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	3-4 Tage nach Testansatz	Ja	S	135	KM-Molekulare-Analytik
Enteroviren PCR qualitativ	RT-PCR qualitativ	Abstriche, Biopsien, Blut, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), EDTA- Blut, Flüssigkeiten, Liquor, Plasma, Punktate, Respiratorische Proben, Serum, Stuhl nativ, Urin	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Enterovirus Typisierung	Immunfluoreszenz ab Zellkultur	Zellkulturmaterial	Bei Viruswachstum	gleichentags	Ja	S	135	KM-Zellbasierte-Virologie
Enterovirus Zellkultur	Kultureller Nachweis	Abstriche, Biopsien, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Flüssigkeiten, Liquor, Punktate, Respiratorische Proben, Stuhl nativ, Urin	täglich ausser Sonntag	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	66.6	KM-Zellbasierte-Virologie
Epstein-Barr Virus EBNA-1 IgG (2)	CMIA	Plasma, Serum	täglich ausser Sonntag	gleichentags	Ja	S	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Epstein-Barr Virus PCR quantitativ	PCR quantitativ	Abstriche, Biopsien, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), EDTA- Blut, Flüssigkeiten, Knochenmark, Liquor, Plasma, Punktate, Respiratorische Proben	2x wöchentlich	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Epstein-Barr Virus VCA IgG (2)	CMIA	Plasma, Serum	täglich ausser Sonntag	gleichentags	Ja	S	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Epstein-Barr Virus VCA IgM (2)	CMIA	Plasma, Serum	täglich ausser Sonntag	gleichentags	Ja	S	29.7	KM-Infektionsdiagnostik
Epstein-Barr Virus IgG Immunoblot mit Avidität	Rekombinanter Immunoblot	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	29.7, 59.4	KM-Infektionsdiagnostik
Epstein-Barr Virus VCA IgG (IF)	IF	Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Fasciola hepatica Antikörper	EIA	Serum, z-Keine weitere Probenarten	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	37.8	KM-Parasitologie
Filarien Antikörper	EIA	Serum, z-Keine weitere Probenarten	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	42.3	KM-Parasitologie
Fluoreszenzfärbungen (Einzeluntersuchung)	Mikroskopie	Abstriche, Biopsien, Punktate, Respiratorische Proben, Urin	Bei Bedarf	gleichentags	Ja	S	26.1	KM-Bakteriologie
Francisella tularensis PCR qualitativ	PCR qualitativ	Abstriche, Biopsien, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Respiratorische Proben	Bei Bedarf	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
FSME PCR qualitativ	PCR qualitativ	EDTA- Blut, Liquor, Plasma, Serum	Externe Analyse		nein	U 35	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Gastroenteritis Multiplex PCR (Salmonella, Shigella, Campylobacter, EHEC)	Real-Time PCR qualitativ	Stuhl	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	139.5, 70.2	KM-Molekulare-Analytik

Analysenangebot

GdA = im Geltungsbereich der Akkreditierung der Klinischen Mikrobiologie
S = Selbst durchgeführt,
U = Unterauftragnehmer (siehe Liste letzte Seite)

Untersuchung	Messmethode	Untersuchungsmaterial	Analysefrequenz	Resultatverfügbarkeit	GdA	S / U	TP	Labor
Gelbfieber Virus PCR qualitativ	PCR qualitativ	Blut, Serum	Externe Analyse		nein	U 9	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Giardia lamblia Antigen	EIA	Stuhl	Montag, Mittwoch, Freitag	gleichentags	Ja	S	29.7	KM-Parasitologie
Helicobacter pylori Antigennachweis	Nachweis bakterieller Antigene: EIA	Stuhl	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	40.5	KM-Bakteriologie
Helicobacter pylori IgG	EIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Helminthen, Nachweis mittels Larvenkultur	Kultureller Nachweis	Stuhl	täglich ausser Samstag und Sonntag	5 Tage nach Testansatz	Ja	S	41.4	KM-Parasitologie
Hepatitis A Virus IgG	CMIA	Plasma, Serum	täglich ausser Sonntag	gleichentags	Ja	S	20.7	KM-Infektionsdiagnostik
Hepatitis A Virus IgM	CMIA	Plasma, Serum	täglich ausser Sonntag	gleichentags	Ja	S	20.7	KM-Infektionsdiagnostik
Hepatitis B Genotypisierung	Sequenzierung	Blut, EDTA- Blut, Plasma, Serum	alle 2 Wochen	3-4 Tage nach Testansatz	Ja	S	119.7, 119.7	KM-Molekulare-Analytik
Hepatitis B Resistenztestung	Sequenzierung	Blut, EDTA- Blut, Plasma, Serum	alle 2 Wochen	3-4 Tage nach Testansatz	Ja	S	119.7, 119.7	KM-Molekulare-Analytik
Hepatitis B Sequenzierung (Genotyp/Drugresistence/Escape)	Sequenzierung	Blut, EDTA- Blut, Plasma, Serum	alle 2 Wochen	3-4 Tage nach Testansatz	Ja	S	119.7, 119.7	KM-Molekulare-Analytik
Hepatitis B Virus Anti-HBe Ig (2)	CMIA	Plasma, Serum	täglich ausser Sonntag	gleichentags	Ja	S	20.7	KM-Infektionsdiagnostik
Hepatitis B Virus Anti-HBs IgG quantitativ (2)	CMIA	Plasma, Serum	täglich ausser Sonntag	gleichentags	Ja	S	18	KM-Infektionsdiagnostik
Hepatitis B Virus HBc Ig (2)	CMIA	Plasma, Serum	täglich ausser Sonntag	gleichentags	Ja	S	18	KM-Infektionsdiagnostik
Hepatitis B Virus HBc IgM (2)	CMIA	Plasma, Serum	täglich ausser Sonntag	gleichentags	Ja	S	20.7	KM-Infektionsdiagnostik
Hepatitis B Virus HBe Antigen (2)	CMIA	Plasma, Serum	täglich ausser Sonntag	gleichentags	Ja	S	20.7	KM-Infektionsdiagnostik
Hepatitis B Virus HBs Antigen (CMIA) (2)	CMIA	Plasma, Serum	täglich ausser Sonntag	gleichentags	Ja	S	15.7	KM-Infektionsdiagnostik
Hepatitis B Virus HBs Antigen Neutralisation	CMIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	21.6	KM-Infektionsdiagnostik
Hepatitis B Virus PCR qualitativ	PCR qualitativ	Blut, EDTA- Blut, Plasma, Serum	Bei Bedarf	3-4 Tage nach Testansatz	Ja	S	119.7, 119.7	KM-Molekulare-Analytik
Hepatitis B Virus PCR quantitativ	PCR quantitativ	Blut, EDTA- Blut, Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Hepatitis C Virus Ak (2)	CMIA	Plasma, Serum	täglich ausser Sonntag	gleichentags	Ja	S	22.5	KM-Infektionsdiagnostik
Hepatitis C Virus Bestätigungstest	Rekombinanter Immunoblot	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	59.4	KM-Infektionsdiagnostik
Hepatitis C Virus Genotypisierung	Hybridisierung	Blut, EDTA- Blut, Plasma, Serum	alle 2 Wochen	2 Tage nach Testansatz	Ja	S	119.7, 162	KM-Molekulare-Analytik
Hepatitis C Virus PCR quantitativ	RT-PCR quantitativ	Blut, EDTA- Blut, Plasma, Serum	2x wöchentlich	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Hepatitis D PCR quantitativ	PCR quantitativ	EDTA- Blut, Plasma	Externe Analyse		nein	U 4	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Hepatitis D Virus Ak	Chemilumineszenz CLIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	26.1	KM-Infektionsdiagnostik
Hepatitis E IgG und IgM	Chemilumineszenz CLIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	26.1, 39.6	KM-Infektionsdiagnostik
Hepatitis E PCR	PCR quantitativ	EDTA- Blut, Plasma	Externe Analyse		nein	U 4	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Hepatitis E Schnelltest IgM qualitativ	Immunchromatographie	Serum	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	Ja	S	39.6	KM-Infektionsdiagnostik
Hepatitis E Virus PCR	PCR qualitativ	EDTA- Blut, Plasma		24 Stunden nach Testansatz	nein	U 3	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Herpes simplex Virus 1 IgG	EIA	Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Herpes simplex Virus 1/2 Zellkultur	Kultureller Nachweis	Abstriche, Biopsien, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Flüssigkeiten, Punktate, Respiratorische Proben, Urin	täglich ausser Sonntag	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	66.6	KM-Zellbasierte-Virologie
Herpes simplex Virus 2 IgG	EIA	Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Herpes simplex Virus Typ 1 PCR	PCR qualitativ	Abstriche, Biopsien, Blut, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), EDTA- Blut, Flüssigkeiten, Liquor, Plasma, Punktate, Respiratorische Proben, Serum, Urin	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Herpes simplex Virus Typ 2 PCR	PCR qualitativ	Abstriche, Biopsien, Blut, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), EDTA- Blut, Flüssigkeiten, Liquor, Plasma, Punktate, Respiratorische Proben, Serum, Urin	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Histoplasma capsulatum	Immundiffusion	Serum	Externe Analyse		nein	U 12	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Histoplasmose Antigen im Urin	ELISA	Urin nativ	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	69.3	KM-Mykologie
HIV 1 DNA ultrasensitiv (Mega-PCR)	RT-PCR qualitativ	EDTA- Blut	Externe Analyse		nein	U 36	119.7, 119.7	KM-Molekulare-Analytik
HIV 1 Resistenztestung	Sequenzierung	EDTA- Blut, Plasma	Externe Analyse		nein	U 36	549	KM-Molekulare-Analytik
HIV 2 DNA ultrasensitiv (Mega-PCR)	RT-PCR qualitativ	EDTA- Blut	Externe Analyse		nein	U 14	119.7, 119.7	KM-Molekulare-Analytik
HIV 2 quantitative PCR	RT-PCR quantitativ	EDTA- Blut, Plasma	Externe Analyse		nein	U 3	119.7	KM-Molekulare-Analytik
HIV Medikamente Plasmaspiegel	Liquid chromatography mit mass spectrometry	EDTA- Blut, Plasma	Externe Analyse		nein	U 4		KM-Molekulare-Analytik
HIV-1 PCR quantitativ	RT-PCR quantitativ	CPT-Blut, EDTA- Blut, Liquor, Plasma, PPT-Blut	2x wöchentlich	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
HIV-1/2 Combo (Ag + Ak) (CMIA) (2)	CMIA	Plasma, Serum	täglich ausser Sonntag	gleichentags	Ja	S	18	KM-Infektionsdiagnostik
HIV-1/2 Combo (Ag + Ak) (EIA)	EIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	18	KM-Infektionsdiagnostik
HIV-1/2 Immunoblot	Rekombinanter Immunoblot	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	59.4, 59.4	KM-Infektionsdiagnostik
HTLV-I/II IgG	CMIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	26.1	KM-Infektionsdiagnostik
Humane Papillomaviren PCR	Hybridisierung, PCR	Abstriche, Biopsien	Externe Analyse		nein	U 4	162	KM-Molekulare-Analytik
Humanes Herpesvirus 6 PCR quantitativ	PCR quantitativ	Biopsien, Blut, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), CPT-Blut, EDTA- Blut, Liquor, Plasma, Serum	Externe Analyse		nein	U 25	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Humanes Herpesvirus 7 PCR quantitativ	PCR quantitativ	Biopsien, Blut, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), CPT-Blut, EDTA- Blut, Plasma, Serum	Externe Analyse		nein	U 25	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Humanes Herpesvirus 8 PCR quantitativ	PCR quantitativ	Blut, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), CPT-Blut, EDTA- Blut, Plasma, Serum	Externe Analyse		nein	U 25	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Humanes Metapneumovirus PCR qualitativ	PCR qualitativ	Abstriche nasopharyngeal, Biopsien, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Flüssigkeiten, Punktate, Respiratorische Proben	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S		KM-Molekulare-Analytik

Analysenangebot

GdA = im Geltungsbereich der Akkreditierung der Klinischen Mikrobiologie
S = Selbst durchgeführt,
U = Unterauftragnehmer (siehe Liste letzte Seite)

Untersuchung	Messmethode	Untersuchungsmaterial	Analysefrequenz	Resultatverfügbarkeit	GdA	S / U	TP	Labor
Humanes Metapneumovirus Zellkultur	Kultureller Nachweis	Abstriche nasopharyngeal, Biopsien, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Flüssigkeiten, Punktate, Respiratorische Proben	täglich ausser Sonntag	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	66.6	KM-Zellbasierte-Virologie
Influenzavirus A PCR qualitativ	PCR qualitativ	Abstriche nasopharyngeal, Biopsien, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Flüssigkeiten, Punktate, Respiratorische Proben	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Influenzavirus A Zellkultur	Kultureller Nachweis	Abstriche nasopharyngeal, Biopsien, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Flüssigkeiten, Punktate, Respiratorische Proben	täglich ausser Sonntag	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	66.6	KM-Zellbasierte-Virologie
Influenzavirus B PCR qualitativ	PCR qualitativ	Abstriche nasopharyngeal, Biopsien, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Flüssigkeiten, Punktate, Respiratorische Proben	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Influenzavirus B Zellkultur	Kultureller Nachweis	Abstriche nasopharyngeal, Biopsien, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Flüssigkeiten, Punktate, Respiratorische Proben	täglich ausser Sonntag	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	66.6	KM-Zellbasierte-Virologie
JC Virus (Polyomavirus) PCR	PCR qualitativ	Liquor	2x wöchentlich	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
JC Virus (Polyomavirus) PCR quantitativ	PCR quantitativ	CPT-Blut, EDTA- Blut, Liquor, Plasma, Urin nativ	Externe Analyse		nein	U 25	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Kryptosporidien	Mikroskopischer Nachweis	Biopsien, Punktate	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	Ja	S	40.5	KM-Parasitologie
Kryptosporidien Antigen	EIA	Stuhl	Montag, Mittwoch, Freitag	gleichentags	Ja	S	29.7	KM-Parasitologie
Legionella pneumophila PCR qualitativ	Real-Time PCR qualitativ	Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Nasopharyngeale Sekrete	Montag, Mittwoch, Freitag	gleichentags	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Legionellen Antigen	Nachweis bakterieller Antigene: Immunchromatographie	Urin	täglich	Nächster Vormittag ab 10:00 Uhr	Ja	S	37.8	KM-Bakteriologie
Leishmanien Antikörper	EIA	Serum, z-Keine weitere Probenarten	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	37.8	KM-Parasitologie
Leishmanien mikr. Nachweis aus versch. Materialien	Mikroskopischer Nachweis	Blut, Hautbiopsie, Knochenmark, Lymphknoten	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	Ja	S	40.5	KM-Parasitologie
Leishmanien Nukleinsäureamplifikation	PCR	Blut, Hautbiopsie, Knochenmark, Lymphknoten	2x wöchentlich	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Parasitologie
Leptospiren Antikörper	EIA	Serum	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	nein	U 28	31.5, 42.3	KM-Infektionsdiagnostik
Liaison SARS-CoV-2 Anti-Spikeproteine IgG	Chemilumineszenz CLIA	Plasma, Serum	täglich ausser Sonntag	gleichentags	nein	S	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Malaria	Mikroskopischer Nachweis	Antikoaguliertes Blut	täglich	gleichentags	Ja	S	81.9	KM-Parasitologie
Malaria (ELISA)	EIA	Plasma, Serum	Externe Analyse	gleichentags	nein	U 24	37.8	KM-Parasitologie
Malaria Antigen	Immunchromatographie	Antikoaguliertes Blut	täglich	gleichentags	Ja	S	8.1	KM-Parasitologie
Malaria Nukleinsäureamplifikation	PCR	Antikoaguliertes Blut	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	nein	U 24	119.7	KM-Parasitologie
Masern IgG (EIA)	EIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Masern IgG (IF)	IF	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Masern IgM	Chemilumineszenz CLIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	33.3	KM-Infektionsdiagnostik
Masern real time PCR qualitativ	PCR qualitativ	Abstriche, Blut, Liquor, Nasopharyngeale Sekrete, Urin	Bei Bedarf	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Masernvirus Zellkultur	Kultureller Nachweis	Abstriche, Biopsien, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Flüssigkeiten, Punktate, Respiratorische Proben, Urin	täglich ausser Sonntag	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	66.6	KM-Zellbasierte-Virologie
Mikrofilarien im Blut	Mikroskopischer Nachweis	Antikoaguliertes Blut	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	Ja	S	81.9	KM-Parasitologie
Mikrosporidien	Mikroskopischer Nachweis	Liquor, Stuhl, Urin	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	Ja	S	40.5	KM-Parasitologie
Mumps IgG (EIA)	EIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Mumps IgG (IF)	IF	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Mumps IgM	Chemilumineszenz CLIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	29.7	KM-Infektionsdiagnostik
Mumps real time PCR qualitativ	PCR qualitativ	Abstriche, Blut, Liquor, Nasopharyngeale Sekrete, Urin	Externe Analyse	24 Stunden nach Testansatz	nein	U 9	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Mycobacterium tuberculosis, Freisetzung von Interferon-gamma (Elispot)	Elispot	CPT-Blut	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	90	KM-Infektionsdiagnostik
Mycobacterium tuberculosis, Freisetzung von Interferon-gamma	Chemilumineszenz CLIA	QuantiFERON-TB Gold Collection tubes	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	90	KM-Infektionsdiagnostik
Mycobacterium tuberculosis-Komplex, Genomnachweis	Direktnachweis basierend auf Genomnachweis	Biopsien, Punktate, Respiratorische Proben, Urin	täglich	gleichentags	Ja	S	119.7	KM-Mykobakteriologie
Mycobacterium tuberculosis-Komplex, Resistenznachweis	Resistenznachweis basierend auf Genomanalyse	Biopsien, Punktate, Respiratorische Proben, Urin	täglich	gleichentags	Ja	S	119.7	KM-Mykobakteriologie
Mycobacterium tuberculosis-Komplex, Resistenzprüfung	Resistenzprüfung	Biopsien, Isolate, Punktate, Respiratorische Proben, Urin	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	42.3	KM-Mykobakteriologie
Mycoplasma pneumoniae IgG	EIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Mycoplasma pneumoniae IgM	EIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	39.6	KM-Infektionsdiagnostik
Mycoplasma pneumoniae PCR qualitativ	RT-PCR qualitativ	Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Nasopharyngeale Sekrete, Respiratorische Proben	Montag, Mittwoch, Freitag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Mykobakterien, Blutkultur	Mikroskopie, Qualitativer kultureller Nachweis von Mykobakterien	Blut, Knochenmark	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	135	KM-Mykobakteriologie
Mykobakterien, Identifikation	Genomnachweis, Identifikation basierend auf HPLC, Identifikation mittels MALDI-TOF, Identifikation mittels Sequenzierung	Biopsien, Isolate, Punktate, Respiratorische Proben, Urin	Molekular: Dienstag, Donnerstag Klassisch: Bei Bedarf, jedoch mind. 1mal pro Woche	Molekular: nächster Vormittag ab 10:00 Uhr Klassisch: abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	162	KM-Mykobakteriologie
Mykobakterien, Kultur	Mikroskopie, Qualitativer kultureller Nachweis von Mykobakterien	Biopsien, Punktate, Respiratorische Proben, Urin	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	162	KM-Mykobakteriologie

Analysenangebot

GdA = im Geltungsbereich der Akkreditierung der Klinischen Mikrobiologie
S = Selbst durchgeführt,
U = Unterauftragnehmer (siehe Liste letzte Seite)

Untersuchung	Messmethode	Untersuchungsmaterial	Analysefrequenz	Resultatverfügbarkeit	GdA	S / U	TP	Labor
Mykobakterien, spezielle Mikroskopie	Mikroskopie	Biopsien, Knochenmark, Punktate, Respiratorische Proben, Urin	täglich	gleichentags	Ja	S	26.1	KM-Mykobakteriologie
Neisseria gonorrhoeae PCR qualitativ	PCR qualitativ	Abstriche, Biopsien, Erststrahlurin, Flüssigkeiten, Punktate	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	47.7	KM-Molekulare-Analytik
Nicht-tuberkulöse Mykobakterien, Resistenzprüfung	Resistenzprüfung	Biopsien, Isolate, Punktate, Respiratorische Proben, Urin	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	42.3	KM-Mykobakteriologie
Noroviren PCR qualitativ	PCR qualitativ	Erbrochenes, Stuhl nativ	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Noroviren Schnelltest	Immunchromatographie	Erbrochenes, Stuhl nativ	täglich ausser Sonntag	gleichentags	Ja	S	40.5	KM-Zellbasierte-Virologie
Onchocerca volvulus (Direkt-Mikroskopie)	Mikroskopischer Nachweis	Hautbiopsie	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	Ja	S	71.1	KM-Parasitologie
Parainfluenza 1-3 Zellkultur	Kultureller Nachweis	Abstriche nasopharyngeal, Biopsien, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Flüssigkeiten, Punktate, Respiratorische Proben	täglich ausser Sonntag	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	66.6	KM-Zellbasierte-Virologie
Parainfluenza 1-4 PCR qualitativ	PCR qualitativ	Abstriche nasopharyngeal, Biopsien, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Flüssigkeiten, Punktate, Respiratorische Proben	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Parasitenidentifizierung	Mikroskopischer Nachweis	Biopsien, Blut, Liquor, Punktate, Stuhl	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	Ja	S	26.1	KM-Parasitologie
Parasitologie allgemein Stuhl (Protozoen und Helminthen)	Mikroskopischer Nachweis	Stuhl	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	Ja	S	40.5	KM-Parasitologie
Parechoviren PCR qualitativ	PCR qualitativ	Abstriche, Biopsien, Blut, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), EDTA- Blut, Flüssigkeiten, Liquor, Plasma, Punktate, Respiratorische Proben, Serum, Stuhl nativ, Urin	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Parechoviren Zellkultur	Kultureller Nachweis	Abstriche, Biopsien, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Flüssigkeiten, Liquor, Punktate, Respiratorische Proben, Stuhl nativ, Urin	täglich ausser Sonntag	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	66.6	KM-Zellbasierte-Virologie
Parvovirus B19 IgG (IF)	IF	Serum, z-Keine weitere Probenarten	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Parvovirus B19 IgM (IF)	IF	Serum, z-Keine weitere Probenarten	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	33.3	KM-Infektionsdiagnostik
Parvovirus B19 PCR quantitativ	RT-PCR quantitativ	Biopsien, Blut, EDTA- Blut, Fruchtwasser, Gelenkspunktat, Knochenmark-EDTA, Plasma, Serum	Externe Analyse		nein	U 25	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Pilz Breitspektrum Nukleinsäureamplifikation	PCR	Biopsien, Blut, Liquor, Punktate	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	2 Tage nach Testansatz	nein	S	119.7	KM-Mykologie
Pilze ohne Bakterien (Spezialuntersuchung)	Mikroskopie, Qualitativer kultureller Nachweis von Hefe- und Schimmel-Pilzen	Abstriche, Biopsien, Punktate, Respiratorische Proben, Urin	täglich	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	49.5, 77.4	KM-Mykologie
Plasmodium falciparum Antigen - Schnelltest	Immunchromatographie	Antikoaguliertes Blut	täglich	gleichentags	Ja	S	8.1	KM-Parasitologie
Plaut Vincent (Mikroskopie)	Mikroskopie	Abstriche respiratorisch	täglich	Gleichentags vor 16:00 Uhr	Ja	S	19.8	KM-Bakteriologie
Pneumocystis jirovecii (direkte Immunfluoreszenz)	Immunfluoreszenz	Respiratorische Proben	täglich	gleichentags	Ja	S	81.9	KM-Mykologie
Pneumocystis jirovecii PCR qualitativ	PCR qualitativ	Respiratorische Proben	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	81.9	KM-Molekulare-Analytik
Pneumokokken Antigen	Nachweis bakterieller Antigene: Immunchromatographie	Liquor, Urin	täglich	Nächster Vormittag ab 10:00 Uhr	Ja	S	28.8	KM-Bakteriologie
Respiratorische Viren Multiplex PCR	PCR qualitativ	Abstriche nasopharyngeal, Biopsien, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Flüssigkeiten, Punktate, Respiratorische Proben	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7, 47.7, 47.7, 47.7, 47.7	KM-Molekulare-Analytik
Retroviren (PERT Assay)	Generischer Suchtest für alle Retroviren, quantitativ (PERT Assay)	EDTA- Blut, Plasma	Externe Analyse		nein	U 14	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Rhinovirus PCR qualitativ	PCR qualitativ	Abstriche nasopharyngeal, Biopsien, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Flüssigkeiten, Punktate, Respiratorische Proben	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Rickettsia mooseri IgG	IF	Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	nein	U 24	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Rickettsia mooseri IgM	IF	Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	nein	U 24	42.3	KM-Infektionsdiagnostik
Rickettsia rickettsii IgG	IF	Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	nein	U 24	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Rickettsia rickettsii IgM	IF	Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	nein	U 24	42.3	KM-Infektionsdiagnostik
Rotavirus Schnelltest	Immunchromatographie	Stuhl nativ	täglich ausser Sonntag	gleichentags	Ja	S	13.3	KM-Zellbasierte-Virologie
Röteln (Rubella) Virus PCR qualitativ	PCR qualitativ	Abortmaterial, EDTA-Blut, fetal, Fruchtwasser, Liquor, Rachenabstrich, Urin	Externe Analyse		nein	U 9	162	KM-Molekulare-Analytik
Röteln (Rubella) Virus Zellkultur	Kultureller Nachweis	Abstriche, Biopsien, Flüssigkeiten, Punktate, Urin	täglich ausser Sonntag	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	66.6	KM-Zellbasierte-Virologie
Rötelnvirus IgG	CMIA	Plasma, Serum	täglich ausser Sonntag	gleichentags	Ja	S	15.7	KM-Infektionsdiagnostik
Rötelnvirus IgG Avidität	EIA	Plasma, Serum	Externe Analyse		nein	U 19	29.7	KM-Infektionsdiagnostik
Rötelnvirus IgM (CMIA)	CMIA	Parasitenidentifizierung, Serum	täglich ausser Sonntag	gleichentags	Ja	S	22.5	KM-Infektionsdiagnostik
Rötelnvirus IgM (EIA)	EIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	26.1	KM-Infektionsdiagnostik
RSV (Respiratorisches-Synzytial-Virus) PCR qualitativ	PCR qualitativ	Abstriche nasopharyngeal, Biopsien, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Flüssigkeiten, Punktate, Respiratorische Proben	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
RSV (Respiratorisches-Synzytial-Virus) Zellkultur	Kultureller Nachweis	Abstriche nasopharyngeal, Biopsien, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Flüssigkeiten, Punktate, Respiratorische Proben	täglich ausser Sonntag	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	66.6	KM-Zellbasierte-Virologie
Salmonellen Antikörper	Agglutination	Plasma, Serum	Externe Analyse	24 Stunden nach Testansatz	nein	U 28	37.8, 37.8	KM-Infektionsdiagnostik
SARS-CoV-2 PCR qualitativ	PCR qualitativ	Abstriche, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Speichelspülflüssigkeit	Bei Bedarf	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	72	KM-Molekulare-Analytik
SARS-CoV-2 Zellkultur	Kultureller Nachweis	Abstriche respiratorisch, Biopsien, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Flüssigkeiten, Punktate, Respiratorische Sekrete	täglich ausser Samstag und Sonntag	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	66.6	KM-Zellbasierte-Virologie

Analysenangebot

GdA = im Geltungsbereich der Akkreditierung der Klinischen Mikrobiologie
S = Selbst durchgeführt,
U = Unterauftragnehmer (siehe Liste letzte Seite)

Untersuchung	Messmethode	Untersuchungsmaterial	Analysefrequenz	Resultatverfügbarkeit	GdA	S / U	TP	Labor
Schimmelpilze Resistenzprüfung MHK, kommerziell	Resistenzprüfung	Subkulturen	täglich	2 Tage nach Testansatz	Ja	S	23.4	KM-Mykologie
Schistosoma haematobium	Mikroskopischer Nachweis	Urin	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	Ja	S	32.4	KM-Parasitologie
Schistosoma sp. Antikörper	EIA / WB	Serum, z-Keine weitere Probenarten	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	42.3, 42.3	KM-Parasitologie
Schistosoma spp. Western Blot LDBIO	WB	Serum	Wöchentlich	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S		KM-Parasitologie
Sprosspilze Resistenzprüfung MHK, kommerziell	Mikrodilution	Subkulturen	täglich	2 Tage nach Testansatz	Ja	S	23.4	KM-Mykologie
Streptokokken AntiDNase B	Neutralisation	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Strongyloides Antikörper	EIA	Serum, z-Keine weitere Probenarten	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	44.1	KM-Parasitologie
Strongyloides stercoralis	Mikroskopischer und kultureller Nachweis	Stuhl	täglich ausser Samstag und Sonntag	Mikroskopie: gleichentags Kultur: Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	40.5, 41.4	KM-Parasitologie
Taenia Solium Antikörper	EIA / WB	Liquor, Serum	2x wöchentlich	24 Stunden nach Testansatz	nein	S	42.3, 73.8	KM-Parasitologie
Taenia solium Western blot	WB		Wöchentlich	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	73.8	KM-Parasitologie
Toxocara Antikörper	EIA	Serum, z-Keine weitere Probenarten	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	37.8	KM-Parasitologie
Toxocara Western blot LDBIO	WB	Serum	Wöchentlich	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S		KM-Parasitologie
Toxoplasma IgG Avidität	CMIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	63.9	KM-Infektionsdiagnostik
Toxoplasma gondii IgG (CMIA) (2)	CMIA	Plasma, Serum	täglich ausser Sonntag	gleichentags	Ja	S	15.7	KM-Infektionsdiagnostik
Toxoplasma gondii IgM (CMIA)	CMIA	Plasma, Serum	täglich ausser Sonntag	gleichentags	Ja	S	22.5	KM-Infektionsdiagnostik
Toxoplasma gondii PCR	PCR qualitativ	Biopsien, EDTA- Blut, Fruchtwasser, Liquor	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	nein	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Toxoplasmose PCR qualitativ	PCR qualitativ	EDTA- Blut, Fruchtwasser, Liquor	2x wöchentlich	Nächster Vormittag ab 10:00 Uhr	Ja	S	119.7	KM-Parasitologie
Treponema pallidum Bestätigungstest	Rekombinanter Immunoblot	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	29.7, 37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Treponema pallidum RPR (VDRL)	Agglutination	Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	16.2	KM-Infektionsdiagnostik
Treponema pallidum Suchtest (2)	CMIA	Plasma, Serum	täglich ausser Sonntag	gleichentags	Ja	S	31.5	KM-Infektionsdiagnostik
Treponema pallidum TPHA	Agglutination	Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	31.5	KM-Infektionsdiagnostik
Trichinella spiralis Antikörper	EIA	Serum, z-Keine weitere Probenarten	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	Ja	S	42.3, 42.3	KM-Parasitologie
Trichinella Western blot LDBIO	WB	Serum	Wöchentlich	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S		KM-Parasitologie
Trichomonas PCFR qualitativ (Xpert TV)	PCR qualitativ	Abstriche genital, Ejakulat, Urin	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	Ja	S	119.7	KM-Parasitologie
Trichomonas vaginalis PCR qualitativ	PCR qualitativ	Abstriche genital, Abstriche urethral, Ejakulat, Urin	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Tropheryma whippeli PCR qualitativ	PCR qualitativ	Biopsien, EDTA- Blut, Punktate, Stuhlproben	Externe Analyse		nein	U 2	119.7	KM-Bakteriologie
Trypanosoma brucei	IHA	Serum	Externe Analyse		nein	U 24	42.3	KM-Infektionsdiagnostik
Trypanosoma cruzi	EIA	Serum	Externe Analyse		nein	U 24	42.3	KM-Infektionsdiagnostik
Trypanosomen (Direkt-Mikroskopie)	Mikroskopischer Nachweis	Antikoaguliertes Blut, Knochenmark	täglich ausser Samstag und Sonntag	gleichentags	Ja	S	40.5	KM-Parasitologie
Varicella-Zoster-Virus IgA	EIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Varicella-Zoster-Virus IgG (CLIA)	Chemilumineszenz CLIA	Plasma, Serum	täglich ausser Sonntag	gleichentags	Ja	S	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Varicella-Zoster-Virus IgG (IF)	IF	Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Varicella-Zoster-Virus IgM (CLIA)	Chemilumineszenz CLIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	29.7	KM-Infektionsdiagnostik
Varizella-Zoster-Virus PCR qualitativ	PCR qualitativ	Abstriche, Biopsien, Blut, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), EDTA- Blut, Flüssigkeiten, Liquor, Plasma, Punktate, Respiratorische Proben, Serum	täglich ausser Samstag und Sonntag	24 Stunden nach Testansatz	Ja	S	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Varizella-Zoster-Virus Zellkultur	Kultureller Nachweis	Abstriche, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Respiratorische Proben	täglich ausser Sonntag	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	66.6	KM-Zellbasierte-Virologie
Varizelle Zoster IgG	EIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Virus Isolierung aus Zellkultur	Kultureller Nachweis	Abstriche nasopharyngeal, Biopsien, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Flüssigkeiten, Punktate, Respiratorische Proben	täglich ausser Sonntag	Abhängig von der Vermehrungsgeschwindigkeit des pathogenen Erregers	Ja	S	66.6	KM-Zellbasierte-Virologie
West Nile Virus PCR qualitativ	PCR qualitativ	EDTA- Blut, Liquor, Plasma	Externe Analyse		nein	U 9	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Yersinien IgA	EIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	26.1	KM-Infektionsdiagnostik
Yersinien IgG	EIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	26.1	KM-Infektionsdiagnostik
Yersinien IgM	EIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	26.1	KM-Infektionsdiagnostik
Zeckenenzephalitis (FSME) IgG	EIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	37.8	KM-Infektionsdiagnostik
Zeckenenzephalitis (FSME) IgM	EIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	29.7	KM-Infektionsdiagnostik
Zika Virus PCR	PCR qualitativ	EDTA- Blut, Plasma, Urin	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	24 Stunden nach Testansatz	nein	U 9	119.7	KM-Molekulare-Analytik
Zikavirus IgG und IgM quantitativ	EIA	Plasma, Serum	Bei Bedarf, jedoch mind. 1 mal pro Woche	gleichentags	Ja	S	29.7, 37.8	KM-Infektionsdiagnostik

Analysenangebot

GdA = im Geltungsbereich der Akkreditierung der Klinischen Mikrobiologie
S = Selbst durchgeführt,
U = Unterauftragnehmer (siehe Liste letzte Seite)

U-Nr.	Name	Strasse	PLZ	Stadt	Land	Akkreditierung	Swissmedic-Bewilligung
U2	Bioanalytica AG	Maihofstrasse 95a	CH-6000	Luzern 6	Schweiz	STS 0273	511751-102704326
U3	Blutspendedienst SRK Bern AG, Labordiagnostik	Murtenstrasse 133	CH-3008	Bern	Schweiz	STS 0371	512352-102649344
U4	CHUV, Centre Hospitalier Universitaire vaudois, Institut de Microbiologie	48, rue de Bugnon	CH-1011	Lausanne	Schweiz	STS 0328	511183-102674469
U9	HUG, Hôpitaux Universitaires de Genève, laboratoire de virologie	4, rue Gabrielle-Perret-Gentil	CH-1211	Genève 14	Schweiz	STS 0553	511784-102671675
U12	Institut für Medizinische Mikrobiologie der Universität Zürich	Gloriastrasse 30/32	CH-8006	Zürich	Schweiz	STS 0266	511641-102706647
U14	Institut für Medizinische Virologie der Universität Zürich	Winterthurerstrasse 190	CH-8057	Zürich	Schweiz	STS 0263	511641-102706647
U15	Institut für Parasitologie der Universität Zürich, Diagnostikzentrum Parasitologie	Winterthurerstrasse 266a	CH-8057	Zürich	Schweiz	STS 0346	511641-102706647
U19	Prof. Dr. G. Enders MVZ	Rosenbergstr. 85	D-70193	Stuttgart	Deutschland	D-ML-17120-01-00	Deutschland
U24	Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut	Socinstrasse 57	CH-4002	Basel	Schweiz	STS 0426	511172-102673075
U25	Universitätsspital Basel, Labormedizin	Petersgraben 4	CH-4031	Basel	Schweiz	STS 0568	512807-102708228
U28	Zentrum für Labormedizin (St. Gallen)	Frohbergstrasse 3	CH-9001	St. Gallen	Schweiz	STS 0155	512444-102668991
U35	LABOR SPIEZ, Prüfstelle für den Nachweis biologischer Agenzien	Austrasse	CH-3700	Spiez	Schweiz	STS 0054	511333-102666093
U36	NZR, Nationales Referenzzentrum für Retroviren, Institut für Medizinische Virologie der Universität Zürich	Winterthurerstrasse 190	CH-8057	Zürich	Schweiz	STS 0263	511641-102706647